

RICHTIG FÜTTERN

bei

PPID

Pituitary Pars Intermedia Dysfunktion*

und

EMS

Equines Metabolisches Syndrom

* alt: ECS (Equines Cushing Syndrom)



Boehringer
Ingelheim

Die richtige Fütterung fördert die Gesundheit Ihres Pferdes und unterstützt die Therapie

Achten Sie bei diesen Symptomen auf jeden Fall auf die Fütterung:

Abmagerung



Muskelatrophie



Adipositas (Übergewicht)



Hufrehe



Immer das Krankheitsstadium und den Ernährungszustand berücksichtigen.
Problemorientiert füttern!

Noch besser: Rationskalkulation

PPID (ECS)-Patienten

mit Muskelatrophie und/oder Abmagerung

Ohne Insulindysregulation

▶ Energiezufuhr

- **Rohfaserreich**
 - Heu ad libitum
 - Weitere rohfaserreiche Ergänzung, z. B. nicht melassierte Rübenschnitzel, Möhrenchips, Luzerne
- **Austausch von Stärke gegen Fett**
 - Pflanzenöl, z. B. Sonnenblumenöl (~50 ml / 100 kg KM nach Adaptation)
300 ml Pflanzenöl ersetzen die Energiezufuhr von 1 kg Hafer
 - Omega-3-Fettsäuren (20 - 50 ml Leinöl / 100 kg KM)
 - Reiskleie (100 - 500 g / 100 kg KM)
 - Kommerzielle stärke- und zuckerreduzierte Ergänzungsfutter („EMS“- oder „PSSM“- Ergänzungsfutter)

▶ Kompensation von Muskelabbau

- Sojaextraktionsschrot, Erbsenflocken, Luzerne oder Bierhefe: 50 g / 100 kg KM
- Kasein, z. B. Milchaustauscher für Fohlen (ca. 20 g / 100 kg KM) mit dem Krippenfutter
- Aminosäurenpräparat: **Equitop Myoplast®**

Mit Insulindysregulation

▶ KEINE Kohlenhydrate mit hoher Glukose- und Insulinreaktion

zum Beispiel Gras, Getreide, Obst, Karotten

PPID (ECS)- und EMS-Patienten

mit Insulindysregulation, Hufrehe(risiko), Adipositas

- ▶ **KEINE Kohlenhydrate mit hoher Glukose- und Insulinreaktion**
zum Beispiel Kraftfutter, Gras, Getreide, Obst, Karotten
- ▶ **Energiereduktion: Heu**
 - 1,2 bis 1,5 kg /100 kg KM
 - Ggf. bis zu 30% durch hochwertiges Stroh ersetzen
- ▶ **Verbesserung der Proteinversorgung**
 - Luzerne (200 g / 100 kg KM)
 - Getrocknete Bierhefe (20–50 g / 100 kg KM)
 - Nutraxin® (1 Riegel / 125 kg KM)
- ▶ **Bedarfsgerechte Vitamine und Mineralstoffe**
 - Nutraxin® (1 Riegel / 125 kg KM)

▶ **Heufütterung**

- Heu abwiegen
- Evtl. das Heu 0,5 – 3 h wässern
(Auswaschen der wasserlöslichen Kohlenhydrate)
- Kleine Portionen über den Tag verteilen
- Fresszeiten verlängern
- In engmaschigem Heunetz oder Raufe anbieten

Erfolgskontrollen

- ▶ **Regelmäßige Gewichtskontrolle durch Wiegen oder Maßband**
- ▶ **Blutwerte kontrollieren lassen**
 - **ACTH-Wert**
 - **Insulinwerte**

Konsequenz und Durchhaltevermögen sind gefragt!

Im Interesse Ihres Pferdes: Bleiben Sie dran!



Ihre Endokrinologie-Experten

Profitieren Sie von:

- langjähriger Expertise
- unserem umfangreichen Serviceangebot
- dem bewährten Pergolid und Nutraxin®



DIE
PPID-Experten



Große
Erfahrung



Das bewährte
Pergolid



Service-
Leistungen

www.cushing-hat-viele-Gesichter.de

www.nutraxin.de

Kennen Sie schon unsere Apps?

Das mobile
Cushing-
Tagebuch



- + Erinnerungsfunktion für tägliche Medikamentengabe
- + Dokumentation Therapieverlauf

in der kostenlosen Vetmedica-App!

Die praktische
Nutraxin®-App



- + Gewichtskalkulator
- + Trainingstagebuch
- + Aktuelles zur Pferdegesundheit und mehr...

Kostenlos im App Store und bei Google Play

